

Esclerosis múltiple

Algoritmo de tratamiento de la espasticidad¹

medifichas



*Factores desencadenantes de la espasticidad^{1,4}

- Brotes de la esclerosis múltiple
- Progresión de la enfermedad
- Cambios en la temperatura corporal (calor, fiebre, ejercicio físico)
- Estrés psicológico
- Ropa ajustada
- Menstruación
- Fatiga excesiva
- Estímulos dolorosos
- Infecciones
- Fecalomas
- Algunos tratamientos modificadores de la enfermedad
- Úlceras por presión
- Fracturas
- Quemaduras

THC: tetrahidrocannabinol; CBD: cannabidiol

descárgate más medifichas en www.almirallmed.es

1. Oreja-Guevara C, Montalban X, De Andrés C, Casanova-Estruch B, Muñoz-García D, García I, Fernández O. Documento de consenso sobre la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Rev Neurol. 2013;57:359-7
 2. Bethoux F, Marrie RA. A cross sectional study of the impact of spasticity on daily activities in multiple sclerosis. Patient. 2016;9:537-546.
 3. Norbye AD, Midgard R, Thrane G. Spasticity, gait, and balance in patients with multiple sclerosis: A cross sectional study. Physiother Res Int. 2019:e1799.
 4. Balci BP. Spasticity Measurement. Arch Neuropsychiatry. 2018;55(Suppl 1):S49-S53.