



1er estudio

que proporciona datos recientes sobre la opinión del MAP acerca del RCV de los pacientes, sus comorbilidades, grado de control y tratamiento en España.¹



Percepción del MAP

+40%
de sus pacientes¹



RCV alto y muy alto



La terapia más utilizada **rosuvastatina**

La estatina considerada más segura con respecto a los efectos secundarios es¹

Rosuvastatina

69 %

seguida de

Pitavastatina

14 %

Atorvastatina

8 %



Solo 1 de cada 4 pacientes²



alcanza los objetivos terapéuticos de c-LDL

Debido a la utilización de estatinas de potencia intermedia



La mejor estrategia terapéutica para llegar a objetivos es intensificar lo antes posible²



Muy alto RCV

71,10%

Alto RCV

78,20%

No alcanzan los objetivos terapéuticos de c-LDL³



PEOR CONTROL



Pacientes prevención secundaria

VS

MEJOR CONTROL



Pacientes diabéticos

80%

de los cambios relacionados con la seguridad en el tratamiento fueron de³

atorvastatina (+/- ezetimiba)

rosuvastatina (+/- ezetimiba)



10%

de los cambios de tratamientos hipolipemiantes de atorvastatina a rosuvastatina³

debido a



Efectos adversos principalmente musculares

ECV: enfermedad cardiovascular, HTA: hipertensión arterial, MAP: médico de atención primaria, RCV: riesgo cardiovascular.

Estudios patrocinados por Almirall S.A.



Grado de control del Riesgo Cardiovascular en los pacientes dislipémicos

Crestor® y Ateroger®, tus aliados frente a la hipercolesterolemia que acompañan a tus pacientes a lo largo de su tratamiento^{5,6}

Accede a **almirallmed** para más información sobre los estudios



Medicamento sujeto a prescripción médica. Especialidad reembolsable por el SNS con aportación normal.
Crestor® 5 mg, envase de 28 comprimidos, PVPIVA: 4,92 €. Crestor® 10 mg, envase de 28 comprimidos, PVPIVA: 9,83 €. Crestor® 20 mg, envase de 28 comprimidos, PVPIVA: 19,67 €.



Consulta la Ficha Técnica de Crestor®



Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el SNS. Aportación reducida únicamente para los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota.
Ateroger® 10 mg / 10 mg, envase de 30 comprimidos, PVPIVA: 15,92 €. Ateroger® 20 mg / 10 mg, envase de 30 comprimidos, PVPIVA: 18,44 €.



Consulta la Ficha Técnica de Ateroger®

Estudio Teresa Opinión



Riesgo cardiovascular en los pacientes dislipémicos y su grado de control percibido por los médicos de atención primaria

Estudio Teresa AP



Consecución de los objetivos TERapéuticos en pacientes con EStatinas solas o Asociadas a ezetimiba en Atención Primaria

Estudio Teresa Cardio



Consecución de los objetivos de colesterol LDL en pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular tratados con estatinas de alta potencia en Servicios de Cardiología


1. Pallares-Carratala V, Barrios V, Fierro-Gonzalez D, et al. Cardiovascular Risk in Patients with Dyslipidemia and Their Degree of Control as Perceived by Primary Care Physicians in a Survey-TERESA-Opinion Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2023; 20: 2388. 2. Cinza-Sanjurjo S, Barrios V, Fierro-González D, Polo-García J, Pallarés-Carratalá V. Achievement of LDL-Cholesterol Goals in Patients Receiving LLT in Primary Care: TERESA-AP Study. *LDL-Cholesterol Goals in Primary Care*. *Cardiovasc Ther*. 2024. 3. Barrios, V.; Pintó, X.; Escobar, C.; Varona, J.F.; Gámez, J.M. Real-World Attainment of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Goals in Patients at High Risk of Cardiovascular Disease Treated with High-Intensity Statins: The TERESA Study. *J Clin Med*. 2023;12(9):3187; doi:https://doi.org/10.3390/jcm12093187. 4. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Böck M, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur Heart J* [Internet]. 2021 Disponible en: <https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713>. 5. Ficha técnica Crestor®. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de Información del Medicamento. Fecha de acceso: febrero 2025. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/70243/FT_70243.html.pdf. 6. Ficha técnica Ateroger®. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de Información del Medicamento. Fecha de acceso: febrero 2025. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/83657/FT_83657.pdf.

Fecha de elaboración: marzo 2025



La enfermedad cardiovascular (ECV) es la **principal causa de mortalidad** en el mundo.¹

Factores de RCV más frecuentes²



El RCV se estima utilizando **SCORE2** y se asumen como **objetivos terapéuticos** para cada nivel de riesgo los **definidos en las Guías Europeas de Cardiología 2021**.⁴