


Wynzora®

50 microgramos/g + 0,5 mg/g crema
calcipotriol/betametasona



¿Cómo utilizar WYNZORA® en psoriasis palmoplantar?

WYNZORA® está indicado para el tratamiento tópico de la psoriasis vulgaris de leve a moderada, incluyendo la psoriasis del cuero cabelludo, en adultos¹

EFICACIA EN PLACA PALMAR

HOMBRE, 67 años. Acude por lesiones eritemato-descamativas localizadas en palmas y plantas, tratado con **WYNZORA®**²

BASAL



semana

4



La tecnología PAD de WYNZORA® permite mayor difusión y penetración a través de la piel³ (vs. Gel CAL/BDP)

La respuesta individual puede variar según las características del paciente.

EFICACIA EN PLACA PLANTAR

Paciente con psoriasis plantar con afectación de la calidad de vida, tratado con WYNZORA®⁴

BASAL



semana

8



Los pacientes reportaron que su piel se siente bien hidratada después de la aplicación⁵

La respuesta individual puede variar según las características del paciente.

CÓMO APLICAR WYNZORA® EN CUERPO

PASO
1



Aplicar la crema sobre un dedo limpio o directamente sobre la zona afectada por la psoriasis.⁶

PASO
2





Con la yema de los dedos, extender en una fina capa.⁶

58%*

**DE LOS PACIENTES REPORTÓ
HABER ESPERADO MENOS
DE 10 MINUTOS PARA VESTIRSE
TRAS LA APLICACIÓN.⁵**

*129 adultos con psoriasis incluidos en el análisis que llevaban usando o habían usado la crema de CAL/BDP 2 semanas o más. Resultado de un cuestionario online de 30 preguntas.



 = 0,5 gr de crema
= 1% de superficie corporal total (cuerpo y cuero cabelludo)^{7,8}



Accede aquí a la Ficha Técnica de Wynzora®:

Con receta médica. Financiados por el SNS con aportación reducida. Wynzora® 50 microgramos/g + 0,5 mg/g crema, 1 tubo de 60 g. CN731344.1.PVL:28,63€;PVPIVA:44,69€. Wynzora® 50 microgramos/g + 0,5 mg/g crema, 2 tubos de 60 g. CN 749493. PVL: 57,26 €; PVP IVA: 89,39 €. Fecha de elaboración del material: Febrero 2026.

BDP: betametasona dipropionato; CAL: calcipotriol

1. Wynzora®, Ficha Técnica. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/86088/FT_86088.html (último acceso: Febrero 2026). 2. García Núñez A, Bueno Molina R, Khair Fernández I, et al. EFICACIA DE BETAMETASONA/CALCIPOTRIOL EN CREMA ACUOSA APLICADA EN OCCLUSIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS PAMOPANTAR. 11º CONGRESO DE PSORIASIS, AEDV, Madrid, 16-17 Enero 2026. 3. Praestegaard M, Steele F, Crutchley N. Polyaphron Dispersion Technology, A Novel Topical Formulation and Delivery System Combining Drug Penetration, Local Tolerability and Convenience of Application. Dermatol Ther (Heidelb). 2022;12(10):2217-2231. 4. Contreras-Steyls M, Suárez-Pérez JA, Herrera-Acosta E. CAL / BDP CREAM IS EFFECTIVE EVEN IN THE MOST DIFFICULT LOCATIONS. Póster presentado en EADV Symposium 2025, Praga. 5. López Estebaranz JL, Kurzen H, Galván J. Real-world use, perception, satisfaction, and adherence of calcipotriol and betamethasone dipropionate PAD-cream in patients with plaque psoriasis in Spain and Germany: results from a cross-sectional, online survey. J Dermatolog Treat. 2024;35(1):2357618. 6. Wynzora®, Prospecto. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/86088/P_86088.html (último acceso: Febrero 2026). 7. Savary J, Ortonne JP, Aractingi S. The right dose in the right place: an overview of current prescription, instruction and application modalities for topical psoriasis treatments. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005;19 (Suppl 3):14-7. 8. Reolid A, Servitje O, Ginarte M, et al. Validation of an Optical Pencil Method to Estimate the Affected Body Surface Area in Psoriasis. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed). 2020;111(2):143-148.