


Wynzora®

50 microgramos/g + 0,5 mg/g crema
calcipotriol/betametasona




¿Cómo utilizar WYNZORA® en psoriasis en el cuero cabelludo?

WYNZORA® está indicado para el tratamiento tópico de la psoriasis vulgaris de leve a moderada, incluyendo la psoriasis del cuero cabelludo, en adultos¹

EFICACIA EN PLACAS EN LÍNEA DE IMPLANTACIÓN DEL CABELLO

MUJER, 27 años. Con psoriasis en cuero cabelludo moderada (PGA del cuero cabelludo: 3) tratado con WYNZORA®²

BASAL



semana

4



**No es necesario lavar el pelo
antes de la aplicación³**

La respuesta individual puede variar según las características del paciente.



**La crema se absorbe de forma rápida⁴
y se elimina fácilmente al lavar el pelo⁵**

EFICACIA EN PLACAS EN EL CUERO CABELLUDO

HOMBRE, 38 años. Con psoriasis en cuero cabelludo moderada (PGA del cuero cabelludo:3) tratado con **WYNZORA®**²



El **83%*** consideró a **WYNZORA®**
su **PREFERENCIA EN CUERO CABELLUDO**
respecto a **tratamientos tópicos previos^{2†}**

La respuesta individual puede variar según las características del paciente.

*82,9%;[†]134 adultos con psoriasis en cuero cabelludo de leve a moderada incluidos en el análisis con datos reportados tras 8 semanas de tratamiento. Resultados de un cuestionario de 5 ítems.²

CÓMO APLICAR WYNZORA® EN CUERO CABELLUDO

PASO
1



Peinar el cabello para eliminar cualquier escama suelta.³

PASO
2





Separar el cabello antes de usar este medicamento.³

PASO
3



Con la yema de los dedos, aplicar la crema directamente en las zonas con placas psoriásicas y masajear bien en una fina capa.³



 = 0,5 gr de crema
= 1% de superficie corporal total (cuerpo y cuero cabelludo)^{6,7}



Accede aquí a la Ficha Técnica de Wynzora®:

Con receta médica. Financiados por el SNS con aportación reducida. Wynzora® 50 microgramos/g + 0.5 mg/g crema, 1 tubo de 60 g. CN731344.1.PVL:28,63€;PVPIVA:44,69€. Wynzora® 50microgramos/g + 0,5 mg/g crema, 2 tubos de 60 g. CN 749493. PVL: 57,26 €, PVP IVA: 89,39 €. Fecha de elaboración del material: Febrero 2026.

PGA: evaluación global del medico (physician global assessment).

1. Wynzora®, Ficha Técnica. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/86088/FT_86088.html (último acceso: Febrero 2026). 2. Pinter A, López Estebaranz JL, Bewley A, et al. Patient and Clinician-Reported Outcomes and Adherence to Calcipotriene/Betamethasone Dipropionate PAD-Cream in Treatment of Scalp Psoriasis in Adults: An Interim Analysis of the SCALP Study. JEADV Clin Pract. 2025;4:791-802. 3. Wynzora®, Prospecto. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/g/86088/P_86088.html (último acceso: Febrero 2026). 4. Stein Gold L, Green L, Dhawan S, et al. A phase 3, randomized trial demonstrating the improved efficacy and patient acceptability of fixed dose calcipotriene and betamethasone dipropionate cream. J Drugs Dermatol. 2021;20(4):420-425. 5. López Estebaranz JL, Kurzen H, Galván J. Real-world use, perception, satisfaction, and adherence of calcipotriol and betamethasone dipropionate PAD-cream in patients with plaque psoriasis in Spain and Germany: results from a cross-sectional, online survey. J Dermatolog Treat. 2024;35(11):2357618. 6. Savary J, Ortonne JP, Aractingi S. The right dose in the right place: an overview of current prescription, instruction and application modalities for topical psoriasis treatments. J Eur Acad Dermatol Venerol. 2005;19 (Suppl 3):14-7. 7. Reolid A, Servitje O, Ginarte M, et al. Validation of an Optical Pencil Method to Estimate the Affected Body Surface Area in Psoriasis. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed). 2020;111(2):143-148.